


[www.freemaths.fr](http://www.freemaths.fr)

# CORRIGÉ

CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES  
COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES  
Classes de terminale S • 2011

Source • Guillaume PETIT JEAN

### exercice 1



On peut toujours positionner la barre comme indiqué sur la figure ci-dessus.  
 $\theta$  croît (quand le point de contact avec le bas se déplace vers la droite)

de  $\theta_0$  tel que  $\cos \theta_0 = \frac{6}{7}$  à  $\theta_1$  tel que  $\sin \theta_1 = \frac{5}{7}$

$a \sin \theta + 7 \cos \theta = 6$ , donc  $a = \frac{6 - 7 \cos \theta}{\sin \theta}$ .

Soit  $f(\theta) = \frac{6 - 7 \cos \theta}{\sin \theta}$ , alors  $f'(\theta) = \frac{7 - 6 \cos \theta}{\sin^2 \theta} > 0$ , donc  $f$  est croissante sur  $[\theta_0 ; \theta_1]$

Quand  $\theta$  augmente,  $a$  augmente.

La hauteur 5 du rectangle donne la condition  $7 \sin \theta + a \cos \theta \leq 5$

soit  $7 \sin \theta + \frac{6 - 7 \cos \theta}{\sin \theta} \cos \theta \leq 5$

Soit  $g(\theta) = 7 \sin \theta + \frac{6 - 7 \cos \theta}{\sin \theta} \cos \theta$ , alors  $g'(\theta) = 14 \cos \theta - 6 + \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} (7 - 6 \cos \theta) > 0$

sur  $[\theta_0 ; \theta_1]$ , donc  $g$  est croissante sur  $[\theta_0 ; \theta_1]$ .

$g(\theta_0) \leq 5$  et  $g(\theta_1) \geq 5$ , donc il existe un unique  $\theta_M$  dans  $[\theta_0 ; \theta_1]$  tel que  $g(\theta_M) = 5$   
 $g$  étant croissante, on doit prendre  $\theta \leq \theta_M$ , sinon on dépasse la largeur 5.

La fonction  $f$  est croissante, donc le maximum de  $f(\theta)$  avec la barre contenue dans le colis sera atteinte pour  $\theta = \theta_M$ .

$$\theta_M \text{ vérifie donc le système } \begin{cases} 7 \sin \theta_0 + a \cos \theta_0 = 5 \\ a \sin \theta_0 + 7 \cos \theta_0 = 6 \end{cases}, \text{ ce qui donne } \begin{cases} \cos \theta_0 = \frac{5a - 42}{a^2 - 49} \\ \sin \theta_0 = \frac{6a - 35}{a^2 - 49} \end{cases}$$

De  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ , on déduit que  $(5a - 42)^2 + (6a - 35)^2 = (a^2 - 49)^2$   
Après développement,  $a^4 - 159a^2 + 840a - 588 = 0$

On cherche à écrire l'équation sous la forme  $(a^2 + t)^2 = P(a)$  où  $P$  est un polynôme du second degré à discriminant nul, pour le mettre sous la forme d'un carré.

$(a^2 + t)^2 = a^4 + 2ta^2 + t^2$  donc l'équation s'écrit  $(a^2 + t)^2 = (159 + 2t)a^2 - 840a + 588 + t^2$   
 $\Delta = 840^2 - 4(588 + t^2)(159 + 2t)$ . Une programmation sur calculatrice montre que  $\Delta$  s'annule pour  $t = -42$ . On reprend l'équation avec  $t = -42$ .

$$(a^2 - 42)^2 = 75a^2 - 840a + 2352$$

$$(a^2 - 42)^2 = 3(5a - 28)^2$$

$$\text{donc } a^2 - 42 = \sqrt{3}(5a - 28) \text{ ou } a^2 - 42 = -\sqrt{3}(5a - 28)$$

Or pour des considérations d'aire,  $7a \leq 30$ , donc  $a \leq 5$ , donc la seule équation possible est la première soit  $a^2 - 5\sqrt{3}a + 28\sqrt{3} - 42 = 0$

$$\Delta = 243 - 112\sqrt{3}, \text{ donc } a = \frac{5\sqrt{3} - \sqrt{243 - 112\sqrt{3}}}{2} \approx 0,83 \text{ (l'autre solution est } > 5)$$

## exercice 2

1. a.  $C(1,2,4) = 7$ ,  $C(1,2,5) = 3$  et  $C(1,2,3,4,5) = 15$ .

b. Si  $M = C(a_1, \dots, a_j)$ , alors on peut obtenir toutes les nombres de 1 à  $M$  avec les termes avec  $a_1, \dots, a_j$ .

Si  $a_{j+1} \geq M + 2$ , alors on ne peut pas obtenir  $M + 1$ , donc  $C(a_1, \dots, a_{j+1}) = M$

Si  $a_{j+1} = M + 1$ , toutes les sommes de 1 à  $M$  sont obtenues avec  $a_1, \dots, a_j$

$M + 1$  est obtenue avec  $a_{j+1}$  et pour  $2 \leq k \leq a_{j+1}$ ,  $M + k = (M + k - a_{j+1}) + a_{j+1}$

donc on obtient toutes les sommes de 1 à  $2M + 1$ , donc  $C(a_1, \dots, a_{j+1}) = 2M + 1$

Si  $a_{j+1} < M + 1$ , pour  $1 \leq k \leq a_{j+1}$ ,  $M + k = (M + k - a_{j+1}) + a_{j+1}$ , donc on obtient toutes les sommes de 1 à  $M + a_{j+1}$ , donc  $C(a_1, \dots, a_{j+1}) = M + a_{j+1}$

donc  $C(a_1, \dots, a_j) \neq C(a_1, \dots, a_{j+1}) \Leftrightarrow a_{j+1} \leq M + 1$

Le maximum sera atteint avec  $a_{j+1} = M + 1$ , auquel cas  $C(a_1, \dots, a_{j+1}) = 2M + 1$

c. D'après la question précédente,

si  $a_n \geq C(a_1, \dots, a_{n-1}) + 2$ , alors  $C(a_1, \dots, a_n) = C(a_1, \dots, a_{n-1})$

sinon  $C(a_1, \dots, a_n) = C(a_1, \dots, a_{n-1}) + a_n$

1	1	1	1
2 ( $2 - 1 < 1$ )	3 ( $1 + 2$ )	2	3
4 ( $4 - 3 < 1$ )	7 ( $4 + 3$ )	5	3

reste inchangé car  $5 - 3 \geq 2$

d. Montrons que la capacité maximale pour  $n$  pièces est  $C(1,2,2^2,\dots,2^{n-1})$  avec  $n \geq 1$   
 Montrons par récurrence que  $C(1,2,2^2,\dots,2^{n-1}) = 2^n - 1$   
 $P(1)$  est vraie car  $C(1) = 2^1 - 1$   
 Supposons  $P(n)$  vraie :  $C(1,\dots,2^{n-1}) = 2^n - 1$   
 alors  $C(1,\dots,2^n) = C(1,\dots,2^{n-1}) + 2^n = 2 \times 2^n - 1 = 2^{n+1} - 1$  et  $P(n+1)$  est vraie

Montrons par récurrence que pour tout naturel  $n$  non nul,  $C(a_1,\dots,a_n) \leq 2^n - 1$ , quel que soit  $(a_1,\dots,a_n)$ .

$P(1)$  est vraie car  $C(1) \leq 2^1 - 1$

Supposons  $P(n)$  vraie,  $C(a_1,\dots,a_n) \leq 2^n - 1$ , pour tout  $n$ -uplet  $(a_1,\dots,a_n)$

soit  $(b_1,\dots,b_{n+1})$  un  $n+1$ -uplet, alors d'après la question 1b),

$C(b_1,\dots,b_{n+1}) \leq 2C(b_1,\dots,b_n) + 1 \leq 2(2^n - 1) + 1 \leq 2^{n+1} - 1$

et  $P(n+1)$  est vraie.

2 La meilleure distribution semble être:

pour le vendeur :  $(1,2,\dots,2^{p-1})$  avec une capacité de rendu de  $2^p - 1$

pour l'acheteur :  $(2^p,2^{p+1},\dots,2^{p+n-1}) = (2^p \times 1, 2^p \times 2, \dots, 2^p \times 2^{n-1})$

$C(1,\dots,2^{n-1}) = 2^n - 1$ , donc l'acheteur va pouvoir donner toutes les sommes de la forme  $2^p \times K$ , avec  $K$  entier tel que :  $1 \leq K \leq 2^n - 1$ .

Soit  $2^p(K - 1)$  et  $2^p \times K$ , deux sommes consécutives payables par l'acheteur avec  $K > 1$

Si la somme est  $2^p \times K - 1$ , le vendeur rendra 1

Si la somme est  $2^p \times K - 2$ , le vendeur rendra 2

Si la somme est  $2^p \times (K - 1) + 1 = 2^p \times K - (2^p - 1)$ , le vendeur rendra  $2^p - 1$

Donc le vendeur pourra rendre la monnaie sur toute somme payable par l'acheteur

La capacité commune est donc  $2^p \times (2^n - 1)$

Montrons que c'est la meilleure.

Soit  $(v_1,\dots,v_p)$  de capacité  $M$  et considérons la distribution  $(M+1, 2(M+1), \dots, 2^{n-1}(M+1))$  pour l'acheteur et notons  $C_M$  la capacité commune.

$C_M(M+1, 2(M+1), \dots, 2^{n-1}(M+1)) = (M+1)(2^n - 1)$  par un calcul analogue à ce qui précède.

Pour une autre distribution  $(a_1, \dots, a_n)$ ,

$C_M(a_1,\dots,a_n) = C_M(a_1,\dots,a_{n-1})$  si  $a_n \geq C_M(a_1, \dots, a_{n-1}) + M + 2$   
 $= C_M(a_1,\dots,a_{n-1}) + a_n$  sinon

On montre par récurrence sur  $n$  : «  $\forall (a_1,\dots,a_n), C_M(a_1,\dots,a_n) \leq (M+1)(2^n - 1)$  »

$P(1)$  est vraie, car  $C_M(a_1) \leq M + 1, \forall a_1$

Si  $P(n)$  est vraie, soit  $(b_1,\dots,b_n,b_{n+1})$ ,

$C_M(b_1,\dots,b_{n+1}) \leq C_M(b_1,\dots,b_n) + M + 1 \leq (M+1)(2^n - 1) + (M+1) \leq (M+1)(2^{n+1} - 1)$   
 et  $2^n \leq 1 + 2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ , et  $P(n+1)$  est vraie

Soit donc  $(v_1,\dots,v_p)$  et  $(a_1,\dots,a_n)$  deux distributions quelconques

On pose  $M = C(v_1,\dots,v_p) \leq 2^p - 1$

$C_M(a_1,\dots,a_n) \leq C_M(M+1,\dots,(M+1)2^{n-1}) = (M+1)(2^n - 1) \leq 2^p(2^n - 1)$

### exercice 3

1) On note  $E = \{z^2 / z \in U_{2n}\}$

Soit  $Z \in E$ , alors  $Z = z^2 = \left( e^{\frac{2ik\pi}{2n}} \right)^2 = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$  avec  $0 \leq k \leq 2n-1$  si  $k \geq n, Z = e^{\frac{2i(k-n)\pi}{n}}$

donc  $Z \in U_n$  et  $E \subset U_n$ .

Réciproquement si  $Z \in U_n, Z = e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \left( e^{\frac{2ik\pi}{2n}} \right)^2$  avec  $0 \leq k \leq n-1 \leq 2n-1$

donc  $Z \in E$ , et  $U_n \subset E$

Donc  $E = U_n$ .

Soit  $Z \in U_n, Z = e^{\frac{2ik\pi}{n}} = e^{\frac{2i(2k)\pi}{2n}}$ , avec  $0 \leq k \leq n-1$ , donc  $0 \leq 2k \leq 2n-2 \leq 2n-1$   
donc  $Z \in U_{2n}$ , donc  $U_n \subset U_{2n}$ .

2) a)  $f(z^2) = f(f \circ f(z)) = f \circ f(f(z)) = (f(z))^2$

b)  $f(z) = f(z') \Rightarrow f(f(z)) = f(f(z')) \Rightarrow z^2 = z'^2 \Rightarrow z = \pm z'$

$f(1) = f(1^2) = (f(1))^2$ , donc  $f(1) = 0$  ou  $f(1) = 1$ , mais  $f(1) \in U_{2n}$ , donc  $f(1) = 1$

$1 = f(1) = f((-1)^2) = (f(-1))^2$ , donc  $f(-1) = 1$  ou  $f(-1) = -1$

Supposons que  $f(-1) = -1$ , alors  $f(f(-1)) = f(-1)$ , donc  $1 = f(-1)$  contradictoire  
donc  $f(-1) = 1$

3) si  $n$  est pair,  $n = 2k$ , soit  $z = e^{\frac{i\pi}{2}} = e^{\frac{ik\pi}{k}} = e^{\frac{ik\pi}{n}} = e^{\frac{2ik\pi}{2n}}$  et  $k \leq n \leq 2n-1$ ,  
donc  $z \in U_{2n}$  et  $z^2 = i^2 = -1$

réciproquement s'il existe  $z \in U_{2n}$  tel que  $z^2 = -1$

$z = e^{\frac{2ik\pi}{2n}}$  donc  $z^2 = e^{\frac{2ik\pi}{n}} = e^{i\pi}$  avec  $0 \leq k \leq 2n-1$

$\frac{2k\pi}{n} = \pi + 2k'\pi$ , d'où  $n(1 + 2k') = 2k$ , donc  $n$  est pair.

Soit donc  $n$  pair, et  $z \in U_{2n}$  tel que  $z^2 = -1$ . Supposons qu'il existe une fonction  $f$  solution, alors  $f(z^2) = (f(z))^2$ , donc  $(f(z))^2 = f(-1) = 1$

donc  $f(z) = 1$  ou  $f(z) = -1$

Si  $f(z) = 1 = f(1)$ , alors  $z = \pm 1$ , contradictoire avec  $z^2 = -1$

Si  $f(z) = -1$ ,  $z^2 = f(f(z)) = f(-1) = 1$ , contradictoire

donc il n'y a pas de solution  $f$ .

4) Si  $n = 3k$ , soit  $z = e^{\frac{2i\pi}{3}} = e^{\frac{2ik\pi}{n}} = e^{\frac{2i(2k)\pi}{2n}}$ ,  
 alors  $z \in U_{2n}$ , car on peut vérifier que  $0 \leq k \leq 2n - 1$   
 et  $z^3 = 1$

réciproquement si  $z^3 = 1$  avec  $z \neq 1$  et  $z \in U_{2n}$

alors  $z = e^{\frac{2ik\pi}{2n}} = e^{\frac{ik\pi}{n}}$  donc  $z^3 = e^{\frac{i3k\pi}{n}} = 1 = e^{0i\pi}$

donc  $\frac{3k}{n} = 2k'$ , mais  $0 < k \leq 2n - 1$  ( $k \neq 0$  car  $z \neq 1$ ), donc  $0 < \frac{k}{n} < 2$ ,

donc  $0 < k' < 3$ , donc  $k' = 1$  ou  $k' = 2$

Si  $k' = 1$ ,  $3k = 2n$ , donc  $k$  est pair =  $2K$ , et  $n = 3K$

Si  $k' = 2$ ,  $3k = 4n$ , donc  $k = 2K$ , donc  $3K = 2n$ , puis  $n = 3K'$

Soit  $n = 3k$  et  $z \neq 1$  tel que  $z^3 = 1$  alors  $z \in U_3 \setminus \{1\} = \left\{ e^{\frac{2i\pi}{3}}, e^{\frac{4i\pi}{3}} \right\}$

Supposons qu'il existe  $f$  solution

$z^4 = z$ , donc  $f(z^4) = f(z)$ , donc  $f(z^2)^2 = f(z)$ , puis  $f(z)^4 = f(z)$

$f(z) \in U_{2n}$ , donc  $f(z) \neq 0$ , donc  $f(z)^3 = 1$ , donc d'après  $U_3$ ,  $f(z) = z$  ou  $f(z) = z^2$

si  $f(z) = z$ , alors  $f(f(z)) = f(z)$ , donc  $z^2 = z$ , donc  $z = 0$  car  $z \neq 1$ , impossible car  $z^3 = 1$

si  $f(z) = z^2 = f(f(z))$ , alors  $f(z) = z$  impossible

ou  $f(z) = -z$ , soit  $z^2 = -z$ , donc  $z = 0$  ou  $z = -1$ , impossible

5) a)  $U_n$  est un ensemble fini à  $n$  éléments ( $n$  impair)

Montrons que si  $z \neq z'$ , alors  $g(z) \neq f(z')$  par la contraposée.

Soient  $z$  et  $z' \in U_n$  tel que  $g(z) = g(z')$ , donc tel que  $z^2 = z'^2$

alors  $z = z'$  ou  $z = -z'$

Mais  $z$  et  $z' \in U_n$ , donc  $z^n = 1$  et  $(-z')^n = -1$  ( $n$  impair), donc  $z = -z'$  est impossible  
 donc  $z = z'$

Les  $n$  éléments de  $U_n$  ont pour image  $n$  éléments tous 2 à 2 distincts, donc tout élément de  $U_n$  admet un antécédent unique par  $g$ , donc  $g$  est bijective.

b) Soit  $\varphi = g^{-1} \circ f \circ g$ ,  $\varphi$  est bien une fonction de  $U_n$  dans  $U_n$

En effet, si  $z \in U_n$ ,  $g(z) = z^2 \in U_n$ , et  $f(z^2) = f(z)^2 \in U_n$  d'après la question 1)

$\varphi \circ \varphi = g^{-1} \circ f \circ g \circ g^{-1} \circ f \circ g = g^{-1} \circ f \circ f \circ g$

Soit  $z \in U_n$ ,  $g(z) = z^2 \in U_n$ , et  $f \circ f \circ g(z) = f(f(z^2)) = z^4$  et  $g^{-1}(z^4) = z^2$  car  $z^2 \in U_n$

donc  $\varphi \circ \varphi(z) = z^2$  pour tout  $z \in U_n$ , donc  $\varphi \circ \varphi = g$

c) On définit  $f$  par  $f(z) = \varphi(g^{-1}(z^2))$  pour tout  $z \in U_{2n}$ ,

$f$  est une fonction de  $U_{2n}$  dans  $U_n \subset U_{2n}$

$z^2 \in U_n$ ,  $g^{-1}(z^2) = z' \in U_n$  avec  $z'^2 = z^2$  (avec  $z = z'$  si  $z \in U_n$ )

$f(z) = \varphi(z') \in U_n$ , donc  $g^{-1}((f(z))^2) = f(z)$

donc  $f(f(z)) = \varphi(g^{-1}((f(z))^2)) = \varphi(f(z)) = \varphi \circ \varphi(z') = g(z') = z'^2 = z^2$

d) il suffit de trouver une fonction  $\varphi$  de  $U_5$  dans  $U_5$ , telle que  $\varphi \circ \varphi = g$

On note  $u_k = e^{\frac{2ik\pi}{5}}$ ,  $k \in \{0,1,2,3,4\}$ , en particulier  $u_0 = 1$

On cherche une application  $\varphi$  de  $U_5$  dans  $U_5$ , telle que  $\varphi \circ \varphi = g$ .

$$g(u_0) = u_0, \text{ donc } \varphi \circ \varphi(u_0) = u_0 \quad (1)$$

$$g(u_1) = u_2, \text{ donc } \varphi \circ \varphi(u_1) = u_2 \quad (2)$$

$$g(u_2) = u_4, \text{ donc } \varphi \circ \varphi(u_2) = u_4 \quad (3)$$

$$g(u_3) = u_1, \text{ donc } \varphi \circ \varphi(u_3) = u_1 \quad (4)$$

$$g(u_4) = u_3, \text{ donc } \varphi \circ \varphi(u_4) = u_3 \quad (5)$$

Si  $\varphi(u_0) = u_1$ , alors  $\varphi \circ \varphi(u_0) = \varphi(u_1)$ , donc  $\varphi(u_1) = u_0$ , et  $\varphi \circ \varphi(u_1) = \varphi(u_0) = u_1$ .

Donc  $\varphi(u_0) \neq u_1$ . De même avec les autres  $u_i$ , donc  $\varphi(u_0) = u_0$ .

Pour  $i \neq 0$ ,  $\varphi(u_i) = u_i$  est impossible car alors  $\varphi \circ \varphi(u_i) = u_i$

$\varphi(u_1) = u_2$  donne  $\varphi \circ \varphi(u_1) = \varphi(u_2) \neq u_2$ , donc  $\varphi(u_1) \neq u_2$

donc  $\varphi(u_1) = u_3$  ou  $u_4$

Si  $\varphi(u_1) = u_3$ , alors (2) impose  $\varphi(u_3) = u_2$

Si  $\varphi(u_3) = u_2$ , alors (4) impose  $\varphi(u_2) = u_1$

Si  $\varphi(u_2) = u_1$ , alors (3) impose  $\varphi(u_1) = u_4$ , donc  $u_3 = u_4$  contradiction

De même  $\varphi(u_1) = u_4$  aboutit à une contradiction, donc  $\varphi$  n'existe pas, de même que  $f$ .

e) Si  $n = 9 = 3k$ , on a vu précédemment que  $f$  n'existe pas.

si  $n = 7$ , on note  $u_k = e^{\frac{2ik\pi}{7}}$ ,  $k \in \{0,1,2,3,4,5,6\}$

$$g(u_0) = u_0$$

$$g(u_1) = u_2$$

$$g(u_2) = u_4$$

$$g(u_3) = u_6$$

$$g(u_4) = u_1$$

$$g(u_5) = u_3$$

$$g(u_6) = u_5$$

Il suffit de définir  $\varphi$  par  $\varphi(u_0) = u_0$

$$\varphi(u_1) = u_4$$

$$\varphi(u_2) = u_1$$

$$\varphi(u_3) = u_5$$

$$\varphi(u_4) = u_2$$

$$\varphi(u_5) = u_6$$

$$\varphi(u_6) = u_3$$

On vérifie que  $\varphi \circ \varphi = g$ , puis on définit  $f(z)$  sur  $U_{14}$  par  $f(z) = \varphi(g^{-1}(z^2))$