

[www.freemaths.fr](http://www.freemaths.fr)

# Maths Complémentaires Terminale

Arbres Pondérés



**CORRIGÉ** DE L'EXERCICE

# COUCHE ET LAIT DU NOURRISSON


## CORRECTION

1. Construisons un arbre de probabilités illustrant cette séquence:

D'après l'énoncé, nous avons:

- $N =$  " couche de marque Nouveze ".
- $S =$  " couche de marque Supersec ".
- $D =$  " couche de marque Distributeur ".
  
- $P(N) = 50\%$ .
- $P(S) = 30\%$ .
- $P(D) = 20\%$ .
  
- $V =$  " lait Vitamax ".
- $G =$  " lait Grandivit ".
  
- $P(V) = 60\%$ .
- $P(G) = 1 - 60\% = 40\%$ .

D'où la situation illustrée par l'arbre de probabilités suivant:



2. a. Calculons la probabilité pour que lors d'une séquence couche Nouvonez et lait Grandivit soient utilisés:

Ici, il s'agit de calculer:  $P(N \cap G)$ .

$$P(N \cap G) = P_N(G) \times P(N).$$

Ainsi:  $P(N \cap G) = 40\% \times 50\%$  cad  $P(N \cap G) = 20\%$ .

Au total, la probabilité pour que lors d'une séquence couche Nouvonez et lait Grandivit soient utilisés est de:  $20\%$ .

2. b. Déterminons le coût d'une telle séquence:

Ici, Julie utilise 1 couche Nouvonez ( $0,25\text{€}$ ) et du lait Grandivit pour le biberon ( $0,15\text{€}$ ).

Ainsi, le coût d'une telle séquence est égal à:  $0,25\text{€} + 0,15\text{€}$ .

Au total, le coût d'une telle séquence est de:  $0,40\text{€}$ .

3. Donnons la loi de probabilité de la variable aléatoire X:

- Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable aléatoire  $X$  ?

$X$  est la variable aléatoire qui correspond au coût en euro d'une séquence.

Nous pouvons distinguer 6 séquences différentes:

- couche Nouvonez + lait Vitamax = 0,25€ + 0,10€
- couche Nouvonez + lait Grandivit = 0,25€ + 0,15€
- couche Supersec + lait Vitamax = 0,35€ + 0,10€
- couche Supersec + lait Grandivit = 0,35€ + 0,15€
- couche Distributeur + lait Vitamax = 0,15€ + 0,10€
- couche Distributeur + lait Grandivit = 0,15€ + 0,15€.

Les valeurs que peut prendre  $X$  sont donc:

**0,25€; 0,30€; 0,35€; 0,40€; 0,45€; 0,50€.**

Et par conséquent:  $X(\Omega) = \{0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50\}$ .

- $P(X = 0,25)$ ,  $P(X = 0,30)$ ,  $P(X = 0,35)$  ...  $P(X = 0,50)$  ?

Nous avons: •  $P(X = 0,25) = P(D \cap V) = 60\% \times 20\% = 12\%$

•  $P(X = 0,30) = P(D \cap G) = 40\% \times 20\% = 8\%$

•  $P(X = 0,35) = P(N \cap V) = 60\% \times 50\% = 30\%$

•  $P(X = 0,40) = P(N \cap G) = 40\% \times 50\% = 20\%$

•  $P(X = 0,45) = P(S \cap V) = 60\% \times 30\% = 18\%$

•  $P(X = 0,50) = P(S \cap G) = 40\% \times 30\% = 12\%$ .

• La loi de probabilité de la variable aléatoire  $X$  est donc:

$x_i$	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
$P(X = x_i)$	12%	8%	30%	20%	18%	12%

4. Calculons et interprétons l'espérance de  $X$ :

D'après le cours:  $E(X) = \sum_{i=1}^n P(X = x_i) \times x_i$ .

$$\begin{aligned} \text{Ici: } E(X) &= (12\% \times 0,25) + (8\% \times 0,30) + (30\% \times 0,35) \\ &\quad + (20\% \times 0,40) + (18\% \times 0,45) + (12\% \times 0,50) \\ &= 0,38\text{€}. \end{aligned}$$

**Au total:**  $E(X) = 0,38\text{€}$  ce qui signifie qu'en moyenne une séquence coûte 0,38€.

5. Déterminons la probabilité qu'au cours d'une journée 4 fois la séquence la moins chère soient utilisées:

La séquence la moins chère coûte 0,25€ et a 12% de se réaliser.

Ainsi, la probabilité que 4 fois la séquence la moins chère soient utilisées est de:  $(12\%) \times (12\%) \times (12\%) \times (12\%) = 207 \times 10^{-6}$ .